

Schema för follow-up av mogna extragonadala teratom efter kirurgi, reviderat VSTB nov 2011

Månader

Åtgärd	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Klinisk us	X			X			X			X			X			X			X			X			X
AFP/ β hCG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
Radiologi primärtumör	X			X			X			X			X			X			X			X			X
Lungrtg	X																								

År

Åtgärd	2¼	2½	2¾	3	3¼	3½	3¾	4
Klinisk us	X*	X	X*	X		X		X
AFP/ β hCG	X	X	X	X		X		X
Radiologi primärtumör	X*	X	X*	X		X		X

X* = vid inkomplett resektion

Spädbarn kontrolleras avseende serummarkörer en gång per vecka den första månaden. Om stadigt sjunkande trend glesas provtagningen ut till var 4:e vecka och följs vidare enligt schemat

Radiologisk modalitet för kontroll av primärtumörområde väljs utefter lokalisation. MRT rekommenderas för sacrococcygeala teratom under de första tre åren

Om avslutade kontroller före 18-års ålder

Patienten ska erbjudas återbesök till barnonkologisk mottagning för information om diagnos och behandling vid 18 års ålder