

Schema för follow-up av omogna teratom efter kirurgi, reviderat VSTB nov 2011

Månader

Åtgärd	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Klinisk us	X			X			X			X			X			X			X			X			X
AFP/ β hCG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X
Radiologi primärtumör	X			X			X			X			X			X			X			X			X
Lungrtg	X																								

År

Åtgärd	2¼	2½	2¾	3	3¼	3½	3¾	4
Klinisk us	X	X	X	X		X		X
AFP/ β hCG	X	X	X	X		X		X
Radiologi primärtumör	X	X	X	X		X		X

Spädbarn kontrolleras avseende serummarkörer en gång per vecka den första månaden. Om stadigt sjunkande trend glesas provtagningen ut till var 4:e vecka och följs vidare enligt schemat

Äldre barn med måttligt förhöjt AFP (<1200 μ g/l) kontrolleras avseende serummarkörer en gång per vecka tills normalisering

Radiologisk modalitet för kontroll av primärtumörområde väljs utefter lokalisation. MRT rekommenderas för sacrococcygeala teratom under de första tre åren

Om avslutade kontroller före 18-års ålder

Patienten ska erbjudas återbesök till barnonkologisk mottagning för information om diagnos och behandling vid 18 års ålder