

Uppföljningsplan organfunktioner efter behandlingsavslut (upp till 18 års ålder)

B-NHL

- **Vid behandlingsavslut:** Ekokardiografi, Blodstatus, diff, ferritin, S-kreatinin, ASAT, ALAT, bilirubin, ALP, GT, S-Kreatinin och/eller S-Cystatin-C inklusive uppskattad filtration, regelrätt filtrationsmätning (iohexol- eller Chrome EDTA-clearance), S-elektrolytstatus (Ca, fosfat, Na, K, Alb, Mg), S-bikarbonat, vitamin D, U-protein alternativt U-albumin i relation till U-kreatinin, blodtryck, längd och vikt.
- **Vaccination**
 - enligt nationellt PM_högriskschema. OBS! Efter Rituximab bör nivåer B-lymfocyter kontrolleras innan levande vaccin.
- **Tandläkarbedömning**
 - vid 6 och 12 månader efter behandlingsavslut
- **Gonadfunktion:**
 - Pojkar:
 - Om R1: LH, FSH, SHBG, testosteron vid 18 års ålder
 - Om > R1: Pubertetsutveckling, LH, FSH, testosteron, SHBG årligen från 9-års ålder och under pubertetsutvecklingen samt vid 18 års ålder. Erbjudas spermiebevaring vid 18 års ålder.
 - Flickor: Pubertetsutveckling, LH och FSH (östradiol och SHBG vid behov) årligen från 9-års ålder och under pubertetsutvecklingen samt vid 18 års ålder. Erbjudas reproduktionsmedicinsk konsultation i tonåren.
- **Hjärta:** Om > R2 st II: Ekokardiografi ca vart femte år samt vid 18-års ålder. Regelbundna kontroller av levnadsvanor, BMI, midjemått och blodtryck. Kontroll lipidstatus vid hereditet för tidig hjärtsjukdom.
- **Njure:** Årligen upp till 5 år samt inför 18-års ålder: S-Kreatinin och/eller S-Cystatin-C inklusive uppskattad filtration, elektrolytstatus (Ca, fosfat, Na, K, Alb, Mg), S-bikarbonat, U-protein alternativt U-albumin i relation till U-kreatinin, blodtryck, längd och vikt. Efter 5 år, kontroll minst vart femte år: S-Kreatinin och/eller S-Cystatin-C inklusive uppskattad filtration, U-protein alternativt U-albumin i relation till U-Kreatinin, blodtryck.
- **Skelett:** Bentäthetsmätning med DXA om upprepade frakturer, kotkompressioner och/eller lågenergifrakturer eller kraftig undervikt, tidigast vid 13-15 års ålder och tidigast 2 år efter behandlingsavslut.
- Nyckelmottagning vid (13-), 17 och 18 års ålder